

Le palmier nain



Le palmier nain, palmier doum ou doum ou faux palmier doum (*Chamaerops humilis* L.) est un palmier de petite taille, originaire des régions bordant la mer Méditerranée occidentale. Il est apprécié comme plante ornementale.

C'est la seule espèce du genre *Chamaerops* (genre monotypique qui doit son nom au grec *chamaï*, « nain », et *rhôps*, « buisson »)². Les autres espèces initialement classées dans ce genre ont été reclassées dans des genres voisins comme *Trachycarpus*, notamment *Chamaerops fortunei* devenu *Trachycarpus fortunei*. Les Grecs appelaient le *Chamaerops humilis*, *Phoenix chamaeriphes*, ce qui signifie littéralement « palmier jeté à terre ».

Cette plante est à l'origine du jour « chamerops » qui désigne le quatorzième jour du mois de floréal dans le calendrier républicain, soit l'équivalent du 3 mai dans le calendrier grégorien.

Le *Chamaerops* est une plante cespiteuse ; plusieurs tiges sont générées par le même pied.

Chamaerops humilis est une espèce dioïque. C'est un palmier nain, presque acaule à l'état sauvage, ne dépassant pas deux mètres, qui peut cependant atteindre six à huit mètres de haut en culture dans sa variété *Arborescens*. Il se caractérise notamment par son faux-tronc (stipe) drageonnant. Sa croissance lente favorise l'apparition de nombreux rejets à sa base à l'origine de son apparence en touffe. Au Maroc, on trouve dans les cimetières qui entourent les koubas des spécimens à faux-tronc développé, car échappant au broutage des troupeaux. Ces spécimens sont ainsi protégés de fait et peuvent se développer.

Les feuilles, disposées en rosette terminale, sont palmées en forme d'éventail de 90 cm de diamètre. Le pétiole, long et grêle (jusqu'à un mètre de long), est très épineux. Le limbe est disséqué en 10 à 20 pseudo-folioles allongées et aiguës, raides et coriaces. Les feuilles sont vertes à la face supérieure et presque blanches en dessous.

L'inflorescence est un spadice, entouré d'une spathe courte (30 cm de long), comprenant de nombreuses petites fleurs jaunâtres, mâles ou femelles. C'est généralement (mais pas toujours) une plante dioïque, portant les fleurs mâles et les fleurs femelles sur des pieds séparés.

Les fleurs mâles ont de 6 à 9 étamines qui surmontent un calice charnu, les fleurs femelles comptent trois carpelles monocarpiques charnus.

Les fruits semblables à des dattes sont des drupes oblongues de couleur brun rougeâtre à maturité, de longueur variable (de 2 à 5 cm), rassemblés en une grappe. Leur pulpe est très fibreuse et légèrement sucrée. Très astringents, ils ne sont pas comestibles pour les palmiers indigènes d'Europe. Lavés et bouillis, cette cuisson fait partir l'astringence et l'acidité.

Chamaerops compte deux variétés, répandues dans le Sud de l'Europe (Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, Espagne, Portugal) et Sud de la France, et le Nord de l'Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye).

- *Chamaerops humilis* var. *humilis*. Feuilles vertes.
- *Chamaerops humilis* var. *argentea* André (syn. *C. humilis* var. *cerifera* Becc.). Feuilles grises. Atlas, Afrique du Nord. Réputé
- *Chamaerops humilis* var. *vulcano*. De port compact et sans épine. Les feuilles sont plus épaisses et la plante plus touffue que chez les variétés *Humilis* et *Argentea*.

Il pousse dans des zones sèches, sur des terrains rocaillieux ou sableux, du bord de mer jusqu'à 1 200 mètres d'altitude (au Maroc et Algérie), dans un climat plutôt froid en hiver ; il préfère les expositions ensoleillées et est assez rustique. Il peut supporter des gelées brèves allant jusqu'à -12 °C et certaines populations naturelles sont régulièrement couvertes de neige mais il ne végète qu'à partir de 10 °C et a besoin pour prospérer de températures allant de 22 à 30°C.

Categoría: Palmeras

Familia: Arecaceae

Género: Chamaerops

Especie: humilis subsp. humilis

Zona Geográfica de Origen: Europa mediterránea / África central-norte

Zonas Climáticas: Mediterraneo: Sud ed Isole, Colina USDA 10 a

Porte: Palmeras de màs tallos

Hojas: Hoja en forma de abanico

Colore Foglie: Verde  Grigio 

Periodo de Floración: Giugno / Luglio / Agosto / Settembre

Flor: Raïm (inflorescència)

Colore Fiori: Giallo 

Suolo: Neutro / Caliza / Media suelo

Necesidades Hídricas: Poca agua

Exposición a la Luz: Media Sombra / Sol

Forma: Palmera

Colore Frutti: Viola 